




L'abitudine al fumo in Area Vasta 2 ASUR Marche I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2009-12

L'abitudine al fumo di sigaretta


Secondo i dati 2009-12 del sistema di sorveglianza PASSI, nell'Area Vasta 2, su un totale di 1508 intervistati nella fascia di età 18-69 anni, il 23,7% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette*.

Il 21,4% è invece ex fumatore[^] e il 55% non ha mai fumato[°].

Abitudine al fumo
Area Vasta 2– Pool ASL 2009-12



Fumatori (%)
Pool Asl 2009-12: 28,4%
(IC95%: 28,1%-28,7%)



■ % significativamente superiore al pool
■ % non significativamente diversa dal pool
■ % significativamente inferiore al pool

Prevalenza di fumatori

Area Vasta 2

nei due sessi	Uomini	26,6%
	Donne	20,5%
nelle classi di età	18-24 anni	31%
	25-34 anni	31,9%
	35-49 anni	22,9%
	50-69 anni	18%
nei diversi livelli di istruzione	Nessuna/elementare	18,1%
	Media inferiore	30,6%
	Media superiore	22,9%
	Laurea	19,3%
nelle diverse situazioni economiche	Molte difficoltà	34,1%
	Qualche difficoltà	23,2%
	Nessuna difficoltà	22,3%
cittadinanza	Italiana	23,5%
	Straniera	26,5%

Quanto si fuma

Area Vasta 2

Sigarette fumate in media al giorno	11,8
Fumatori che fumano 20 o più sigarette al giorno	22,3%

L'abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 26,6% e 20,5%), nei 25-34enni (31,9%), e nei 18-24enni (31%) nelle persone con una scolarità media-inferiore (30,6%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (34,1%).

Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 12 (range 1-50, moda e mediana 10). Tra i fumatori, il 21,6% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno). Il 2% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

* Fumatore = persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi (fumatore in astensione, pari all'X%)

[^] Ex fumatore: soggetto che attualmente non fuma e che ha smesso da oltre 6 mesi


[°] Non fumatore: soggetto che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma

L'atteggiamento degli operatori sanitari

Tra gli intervistati che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con un operatore sanitario, al 34,3% è stato chiesto se fumano e tra i fumatori l'53,6% ha ricevuto il consiglio di smettere.

Nella maggior parte dei casi il consiglio è stato dato per motivi di salute (22,3%) ed a scopo preventivo (18%)

Motivo per cui è stato dato il consiglio di smettere di fumare Area Vasta 2- 2009-12




Smettere di fumare

Tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l'intervista, il 45,8% ha tentato di smettere e di questi, l'85,2% ha fallito (fumava al momento dell'intervista), l'7% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento dell'intervista, ma aveva smesso da meno di 6 mesi), mentre l'7,7% è riuscito a smettere (non fumava al momento dell'intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi e meno di un anno).

Tra le persone che hanno tentato di smettere di fumare nell'ultimo anno, indipendentemente dall'esito del tentativo, il 97,6% l'ha fatto da solo, il 0,6% ha fatto uso di farmaci e l'01,2% ha partecipato a incontri o corsi organizzati dalle ASL.

Esito del tentativo di smettere di fumare nei 12 mesi precedenti l'intervista

% fumatori che hanno tentato di smettere di fumare
Area Vasta 2- Pool ASL 2009-12



Il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro

Il 69,8% degli intervistati ha riferito che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è sempre/quasi sempre rispettato (conformemente alla legge). Nel Pool di ASL 2009-12, questa percentuale è dell'88%.

Tra i lavoratori intervistati, l'74,7% ha dichiarato che il divieto di fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi sempre. Nel Pool di ASL 2009-12, tale valore è pari all'90%.

Fumo in casa


L'18,7% degli intervistati dichiara che nella propria abitazione è permesso fumare (nel 14,4% limitatamente ad alcune stanze o situazioni e nel 4,3% ovunque).

Il divieto assoluto di fumare in casa è maggiore (88,4 verso 81,3) in presenza di minori di 15 anni: l'astensione dal fumo infatti è più alta nelle case in cui vive un bambino fino a 14 anni compresi, tuttavia per il 15,6% di queste case il fumo non è ancora stato completamente bandito dall'ambiente domestico.

Rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e divieto di fumo in casa

% di intervistati

Area Vasta 2- Pool ASL 2009-12



Che cos'è il sistema di sorveglianza PASSI?

PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. A dicembre 2012, sono state caricate complessivamente oltre 200 mila interviste. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.

Elaborazione dati : A Guidi - UO Epidemiologia Ancona